



## TEST GRILĂ

1. În reprezentarea grafică a tensiunii arteriale pe foaia de temperatura, latura de sus a dreptunghiului reprezintă:
  - a) tensiunea arterială sistolică
  - b) tensiunea arterială diastolică
  - c) tensiunea arterială medie
  
2. Condițiile unui bun pansament sunt:
  - a) să nu fie dureros
  - b) să fie schimbat la timp
  - c) să fie schimbat la 2 – 3 ore
  
3. Regimul alimentar al pacientului cu insuficiență cardiacă este:
  - a) hiposodat, hipolipidic și hipocaloric
  - b) hiposodat, hiperlipidic și hipocaloric
  - c) hiposodat, hipolipidic și hipercaloric
  
4. Regimul alimentar al pacientului cu anemie cronică va fi:
  - a) hiperproteic
  - b) hipoproteic
  - c) bogat în fier și calciu
  
5. Morbul lui Pott se caracterizează prin:
  - a) cifoză coloanei vertebrale
  - b) paralizia membrelor superioare
  - c) instabilitate hemodinamică
  
6. Delirium tremens se caracterizează prin:
  - a) halucinații vizuale cu caracter terifiant
  - b) mutism prin inhibiție
  - c) idei delirante fixe și sistematizate
  
7. Pentru stabilirea manifestărilor de dependență ale pacientului psihiatric asistentul medical va evalua:
  - a) comportamentul pacientului
  - b) nivelul de conștiință al pacientului
  - c) rezultatul evaluării paraclinice
  
8. Manifestările clinice ale cirozei hepatice includ:
  - a) icterul
  - b) varsături explozive în jet, neprecedate de greață
  - c) ginecomastia
  
9. Valoarea normală a temperaturii măsurată rectal este de:

A



- a) 37 grade +/- 0,3/0,6
- b) 37,5 grade +/- 0,3/0,6
- c) 36,5 grade +/- 0,3/0,6

10. Educatia pentru sanatate a pacientului cu hipertensiune arteriala include urmatoarele principii:

- a) reducerea consumului de sare
- b) verificarea periodica a greutatii si mentinerea acesteia in limite normale
- c) reducerea aportului hidric sub 500 ml pe 24 ore

11. Fracturile cominutive se definesc prin:

- a) fisura incompleta a epifizei oaselor lungi
- b) mentinerea intacta a periostului
- c) ambele raspunsuri sunt incorecte

12. In cazul suspiciunii unei infectii nosocomiale sunt necesare:

- a) hemoculturi
- b) ecografie abdominala
- c) examen radiologic pulmonar

13. Alimentatia artificiala a unui pacient cu stenoza esofagiana postcaustica completa se va face:

- a) pe gastrostoma
- b) peros folosind preparate artificiale standardizate
- c) folosind solutii perfuzabile ce contin principiile alimentare de baza

14. Psihoza alcoolica Korsakov se caracterizeaza prin:

- a) hipomnezie
- b) hipertrofie musculara
- c) hiperamnezie

15. In deliru sistematizat pacientul prezinta:

- a) hiperamnezie globala
- b) hiperamnezie partiala
- c) hiperamnezie selectiva legata de unele amanunte

16. Terapia cu diuretice este indicata la pacientii cu:

- a) insuficienta cardiaca dreapta
- b) hipertensiune arteriala
- c) arteriopatie obliteranta cronica

17. Sangele recoltat prin punctie venoasa periferica poate fi utilizat pentru examene:

- a) biochimice
- b) bacteriologice
- c) ambele variante sunt corecte

18. Disfagia, dificultatea de a inghiti, poate aparea in:

A



- a) accident vascular cerebral
  - b) neoplasm gastric
  - c) afecțiuni neuromusculare
19. Tratamentul infecțiilor severe include:
- a) tratament antibiotic
  - b) asanarea focarelor septice primare abordabile chirurgical
  - c) ambele variante sunt corecte
20. Alimentarea parenterală prin administrarea de soluții perfuzabile ce conțin principiile alimentare de bază va respecta următoarele principii:
- a) ritmul perfuziei va fi foarte lent, 20-40 picături pe minut
  - b) ritmul perfuziei va fi foarte rapid pentru a acoperi în mod eficient necesarul energetic al pacientului
  - c) în timpul administrării soluțiilor nutritive parenterale este permisă hidratarea per os a pacientului
21. Etapele pregătirii preoperatorie a unui pacient propus pentru apendicectomie includ:
- a) pregătirea generală
  - b) pregătirea locală
  - c) pregătirea aparținătorilor pacientului
22. Amnezia este:
- a) o tulburare de memorie
  - b) o tulburare cognitivă
  - c) o tulburare afectivă
23. Pacientul paranoic poate prezenta:
- a) delir de persecuție
  - b) delir de grandoare
  - c) delir de influență cu halucinații vizuale și auditive
24. Enurezisul:
- a) reprezintă creșterea cantității de urină eliminată în timpul nopții cu inversarea raportului nictemeral
  - b) este o formă particulară de incontinență urinară
  - c) se instalează frecvent după vârsta de 45 de ani
25. Este contraindicată administrarea prin perfuzie intravenoasă de soluții:
- a) lipidice de nutriție parenterală
  - b) proteice (aminoacizi)
  - c) uleioase
26. Materialele necesare pentru efectuarea puncției venoase periferice sunt:



- a) solutie dezinfectanta
  - b) garou
  - c) halat si manusi sterile pentru asistentul medical
27. La pacientii aflati in coma acidocetozica examenele de laborator evidentiaza:
- a) scaderea rezervei alcaline
  - b) scaderea potasemiei
  - c) absenta glicozuriei
28. Riscurile antibioprofilaxiei includ:
- a) aparitia rezistentei bacteriene
  - b) cresterea sensibilitatii germenilor patogeni
  - c) ineficienta in prevenirea infectiilor
29. Pregatirea preoperatorie a unui pacient propus pentru interventie chirurgicala laparoscopica se va face tinand seama de :
- a) preferintele pacientului
  - b) afectiunile asociate bolii de baza
  - c) starea biologica a pacientului
30. Tulburarile psihice ce apar la pacientii cu tulburari frontale includ:
- a) stari de buna dispozitie, euforice, care se aseamana cu sindromul maniacal
  - b) mutismul akinetic
  - c) agnozii
31. Senzatiile de derealizare, de instrainare fata de cei din jur apare la:
- a) bolnavul cu schizofrenie
  - b) bolnavul cu manie
  - c) bolnavul cu depresie
32. Durerea din angina pectorala:
- a) poate iradia in umarul si membrul superior drept
  - b) se asociaza frecvent cu dispnee si senzatie de ameteala
  - c) cedeaza la administrarea de nitroglicerina
33. Pacientul cu deshidratare severa prezinta:
- a) hipotensiune arteriala
  - b) tahicardie
  - c) ambele variante sunt corecte
34. Accidentele punctiei rahidiene includ:
- a) paralizia prin lezarea unor structuri nervoase
  - b) tulburari de vorbire
  - c) parestezii la nivelul membrelor pelvine
35. Actiunea hipoglicemianta a insulinei Actrapid administrata pe cale subcutanata dureaza:



- a) 90 minute de la injectare
- b)  $\frac{3}{4}$  ore de la injectare
- c) 6 ore de la injectare

36. Neuropatia diabetica se manifesta prin:

- a) tulburari motorii (pareze)
- b) tulburari senzoriale
- c) ineficienta respiratiei

37. Problemele de dependenta intalnite la pacientul cu glomerulonefrita sunt:

- a) alterarea circulatiei
- b) alterarea starii de constienta
- c) alterarea eliminarii urinare

38. In timpul accesului depresiv pacientul prezinta:

- a) fuga de idei
- b) ideatie incetinita
- c) idei delirante cu continut expansiv

39. Stupoarea este:

- a) o tulburare a starii de constienta
- b) o tulburare de afectivitate
- c) o tulburare ce poate aparea la pacientii melancolici

40. Colica nefritica:

- a) este prototipul durerii lombare unilaterale
- b) apare adesea dupa efort fizic
- c) este generata de distensia capsulei renale

41. Punctia pleurala se numeste:

- a) paracenteza
- b) toracenteza
- c) pericardocenteza

42. Principiile alimentarii pacientului pe gastrostoma sunt:

- a) nu se administreaza mai mult de 100 ml odata, pentru a nu se destinde brusc stomacul
- b) nu se introduc la o masa mai mult de 400 de grame pasate, din cauza tulburarilor de digestie si absorbtiei existente
- c) se pot administra aproximativ 500 de ml la o singura masa

43. Vaccinarea este:

- a) o metoda profilactica
- b) o metoda curativa
- c) o metoda paleativa

44. Explorarea unui pacient cu chist hidatic pulmonar include:

- a) reactia Cassoni



- b) reactia Widal
  - c) reactia Schick
45. La pacientii cu risc operator crescut, pregatirea preoperatorie include:
- a) corectarea deficitelor hidroelectrolitice
  - b) corectarea deficitelor acidobazice
  - c) transfuzia de sange indiferent de valoarea hemoglobinei
46. Simptomele ce prevad instalarea starii depresive la pacientul cu tulburare afectiva bipolara sunt:
- a) lipsa poftei de mancare
  - b) euforia
  - c) logoreea
47. Logoreea este:
- a) cresterea fluxului de cuvinte
  - b) apare in starile maniacale
  - c) apare la debilizii mintali
48. Contractura musculara abdominala este semn de:
- a) hemoragie interna
  - b) iritatie peritoneala
  - c) ocluzie intestinala
49. Pacientii hipertimici sunt:
- a) veseli
  - b) optimisti
  - c) posaci, indispusi
50. Iluziile sunt:
- a) perceptii deformate ale obiectelor
  - b) perceptii fara obiect
  - c) perceptii lipsite de estezie si spatialitate