



GRILĂ CORECToare

EXAMEN ASISTENȚI MEDICALI  
Varianta 1

1. La un pacient cu insuficiență respiratorie acută se recomandă radiografie toracică în poziție:
  - a. decubit dorsal
  - b. șezând
  - c. decubit lateral stâng
  
2. La pacientul inconștient se recomandă:
  - a. Alimentația per os cu pacientul în decubit lateral stâng
  - b. Alimentația parenterală prin administrarea de soluții perfuzabile ce conțin principile alimentare de bază
  - c. Ambele variante sunt corecte
  
3. Îngrijirea pacientului cu infarct miocardic acut implică:
  - a. Combaterea durerii
  - b. Mobilizarea precoce a pacientului în vederea prevenirii complicațiilor
  - c. Combaterea anxietății
  
4. Valoarea normală a glicemiei este:
  - a. 60-120 mg %
  - b. 120-140 mg %
  - c. 200-240 mg%
  
5. Criza de astm se manifestă prin următoarele manifestări:
  - a. Spută rozată, bradipnee
  - b. Spută cu aspect perlat, tahipnee
  - c. Dispnee expiratorie, bradipnee

6. Cauzele insuficienței respiratorii acute includ:

- a. Corp străin intrabronșic
- b. Astmul bronșic
- c. Infarctul miocardic acut

7. Asepsia :

- a. Este o metodă profilactică
- b. Este o metodă curativă
- c. Poate fi înlocuită prin administrarea profilactică de antibiotice

8. Hemoragiile arteriale pot fi recunoscute după:

- a. Culoarea sângelui și presiunea de scurgere a acestuia
- b. Cantitatea de sânge pierdut
- c. Starea generală a pacientului

9. Conduita în caz de accident prin expunere la produse biologice consta în:

- a. Spălare și dezinfecție a tegumentului, anunțarea medicului
- b. Recoltare de probe biologice de la accidentat și sursa
- c. Stimularea sângerării

10. Șocul reprezintă:

- a. stare gravă în care se produc tulburări la nivel celular anoxie și acumularea produselor de catabolism
- b. tulburarea conștienței
- c. un dezechilibru între capacitatea vaselor și masa de sânge circulant

11. Sunteți în fața unui pacient cu șoc anafilactic la penicilină. Ce măsuri luați:

- a. Transport la spital
- b. Administrați medicație antihistaminică
- c. Administrați medicație tonică cardiacă

12. Colapsul vascular se caracterizează prin :

- a. Tegumente calde, hiperemice
- b. Hipotensiune arterială, sub 70 mmHg
- c. Hipertermie

13. Principalele manifestări clinice ale insuficienței respiratorii acute sunt:

- a. dispnea
- b. hipertensiunea arterială
- c. cianoză

14. Tabloul clinic al insuficienței cardiace:
- a. Cianoza perioro-nazală și a extremităților
  - b. Edeme
  - c. Hemoptizie
15. Îngrijirea pacientului cu hemoragie digestivă superioară exteriorizată prin hematemeză și melenă implică:
- a. Pungă cu gheață
  - b. Aplicarea locală de căldură în zona epigastrică
  - c. Repaus la pat
16. Manifestările clinice ale comei hipoglicemice includ:
- a. Tremurături
  - b. Transpirații abundente
  - c. Regumente calde, roșii
17. Pacientul cu colică renală prezintă:
- a. febră
  - b. durere lombară ce iradiază spre organele genitale externe
  - c. agitație
18. Prin contact cu sângele personalul medical poate contacta:
- a. virusul hepatitei B
  - b. H.I.V.
  - c. Virusul hepatiei A
19. În schizofrenie, tulburările de percepție sunt reprezentate de:
- a. Halucinații auditive
  - b. Halucinații corporale
  - c. Ambele
20. Delirium tremens se manifestă prin:
- a. Confuzie cu delir acut
  - b. Febră ridicată
  - c. Tahicardie, hipertensiune arterială

