



ERILĂ CORECTOARE
19.03.2024

EXAMEN ASISTENȚI MEDICALI PRINCIPALI
Varianta 2

1. Care din următoarele manifestări de dependență reprezintă tulburări ale gândirii:
- a. idei delirante legate de propria persoană sau de mediul înconjurător
 - b. lipsa coerenței în vorbire
 - c. diminuarea sau accelerarea mișcărilor

2. Complicațiile principale ale BPCO includ:
- a. insuficiență respiratorie
 - b. hipertensiune arterială
 - c. cord pulmonar cronic

3. Toxicomania este o autointoxicație :
- a. conștientă
 - b. inconștientă
 - c. ambele

4. Oliguria poate apărea în :
- a. șoc hipovolemic
 - b. boala diareică acută
 - c. accident vascular cerebral

5. În colica biliară nu se administrează morfină deoarece:
- a. accentuează spasmul căilor biliare
 - b. maschează simptomatologia
 - c. favorizează apariția icterului

6. Delirium tremens este o complicație a alcoolomaniei:

- a. acută
- b. subacută
- c. cronică

7. Manifestările de dependență specifice în colica biliară sunt:?

- a. durere intensă în hipocondrul drept sau în epigastru
- b. vărsături alimentare cu conținut vechi și gust amar
- c. hipertensiune alimentară

8. În hemoragiile digestive masive bolnavul este așezat în repaus, în poziția Trendelenburg pentru:

- a. menținerea unei circulații cerebrale corespunzătoare
- b. oprirea hemoragiei
- c. menținerea unei circulații periferice corespunzătoare

9. Boliile digestive se transmit prin:

- a. picături, pe cale cutanată, prin intermediul înțepăturii
- b. intermediul mușcăturii unor insecte, alimente, pe cale cutanată
- c. mâini murdare, alimente, prin apă

10. În shizofrenie tulburările de percepție sunt reprezentate de:

- a. halucinații auditive
- b. halucinații corporale
- c. verbigeratia

11. Pacientul cu H T A poate avea una din următoarele probleme de dependență:

- a. Intoleranță la activitate
- b. Deficit de cunoștințe
- c. Alterarea stării de conștiență

12. Complicațiile aspirației traheobronșice includ:

- a. Hipoxie
- b. Hipocapnie
- c. aritmiile cardiace

13. Hipoxia este:
- a. scăderea oxigenului în sânge
 - b. embolie gazoasă
 - c. sindrom de compresiune
14. Heparina poate fi administrată pe cale:
- a. intramusculară, intravenoasă, subcutan
 - b. intravenos, intradermic, subcutan
 - c. intravenos, intramuscular
15. Capacitatea vitală scade la pacienții cu:
- a. pneumonii
 - b. pleurezii
 - c. bronșită acută
16. Expectoratia din edemul pulmonar acut are următoarele caracteristici:
- a. este purulentă
 - b. are aspect rozat, ca albușul de ou bătut
 - c. are culoare ruginie
17. Factorii de risc pentru infecțiile asociate asistenței medicale include:
- a. vârsta
 - b. toleranța digestivă
 - c. terapia imunosupresoare
18. Ce este afazia?
- a. incapacitate de a înghiți
 - b. tulburare de limbaj
 - c. incapacitate patologică de a articula cuvinte
19. Cianoza perioronazală și a extremităților apărută imediat postoperator sugerează:
- a. insuficiență respiratorie
 - b. insuficiență cardiacă
 - c. insuficiență renală
20. Tabloul clinic al insuficienței cardiace include:
- a. cianoză perioronazală și a extremităților
 - b. edeme
 - c. hemoptizia

