



*GRILĂ CORECTOARE PROBA SCEISF*

EXAMEN ASISTENȚI 27.05.2024

Varianta 1

1. Pacientului care a ingerat sodă caustică în urmă cu 3 ore i se acordă primul ajutor care constă în:
  - a. spălătură gastrică cu apă acidulată
  - b. provocare de vărsătură
  - c. administrare de analgezice
  
2. Intervențiile asistentei medicale în cazul unui pacient cu ocluzie intestinală includ următoarele acțiuni, cu excepția:
  - a. montării unui sonde nazo-gastrice
  - b. montării unui sonde urinare
  - c. pregătirea pentru examen radiologic cu substanță de contrast
  
3. Manifestările de dependență ce caracterizează stopul cardiorespirator sunt următoarele, cu excepția:
  - a. midriază, oprirea respirației și circulației
  - b. relaxare sfincteriană, paliditate, cianoză, pierderea conștiinței
  - c. hipotensiune arterială, tahicardie
  
4. Hipertensiunea arterială apărută postoperator poate fi determinată de:
  - a. durere
  - b. hipoxemie
  - c. hipopotasemie
  
5. Hemoragiile postoperatorii pot fi determinate de:
  - a. tulburări de coagulare preexistente
  - b. tulburări de coagulare dobândite în perioada preoperatorie
  - c. administrarea de medicamente hemostatice

6. Voletul costal presupune:

- a. fractura mai multor coaste deodată
- b. fiecare coastă prezintă cel puțin 2 traiecte de fractură
- c. fractura a cel puțin 3 coaste la nivelul fiecărui hemitorace

7. Hemostaza provizorie prin compresiune se realizează prin:

- a. compresiune manuală sau digitală
- b. pansament compresiv
- c. aplicarea antipirinei pe plagă

8. Complicațiile ce pot apărea în îngrijirea unui bolnav cu fractură imobilizat la pat:

- a. escare
- b. embolie pulmonară
- c. tulburări de coagulare în sensul hipocoagulabilității sangvine

9. Problemele pacientului cu tulburări psihice sunt următoarele, cu excepția:

- a. alterarea nutriției
- b. potențial de alterare a integrității fizice
- c. pneumonia

10. Pentru stabilirea manifestărilor de dependență în afecțiunile psihice, asistenta evaluează:

- a. nivelul de conștiență a pacientului
- b. procesele psihice (attenție, memorie, gândire)
- c. comportamentul și înfățisarea

11. Spălătura gastrică este indicată în:

- a. intoxicații alimentare sau cu substanțe toxice
- b. pregătirea preoperatorie în intervențiile de urgență
- c. ulcer gastric în perioada dureroasă

12. Tulburările de comunicare (verbală sau scrisă) sunt reprezentate de următoarele manifestări de dependență:

- a. logoree, mutism, bălbâială
- b. tonul prea ridicat sau prea monoton
- c. deficiențe de caligrafie

13. Schizofrenia reprezintă:

- a. tulburarea de gândire
- b. tulburarea de mișcare

c. tulburarea de vorbire constând într-o însiruire de expresii și fraze fără nici o legătură între ele

14. Tulburări de personalitate în schizofrenie sunt reprezentate de:

- a. fenomene de depersonalizare
- b. dedublarea personalității
- c. fenomene de derealizare

15. Tulburările de gândire în schizofrenie sunt reprezentate de următoarele, cu excepția:

- a. delirul de influență
- b. delirul de persecuție
- c. verbigeratie

16. Asepsia

- a. este metodă profilactică
- b. este metodă curativă
- c. poate fi înlocuită prin administrarea profilactică de antibiotice

17. Arsura de gradul I se caracterizează prin:

- a. eritem
- b. durere
- c. flictene cu lichid hematic

18. Tratamentul chirurgical în ocluzia intestinală

- a. este obligatoriu, ocluzia intestinală fiind o urgență chirurgicală
- b. este contraindicat
- c. este optional

19. La un pacient cu hemoragie digestivă superioară recoltarea unui set de analize în condiții de urgență va include în mod obligatoriu și determinarea:

- a. grup sanguin
- b. proteinemiei
- c. glicemiei

20. În cazul unui accident colectiv sunt primii carora li se va acorda primul ajutor:

- a. cei care tipă, strigă după ajutor
- b. cei inertă
- c. nu au importanță aceste elemente

